

## BELANGRIJKE INFO/IMPORTANT INFO

### MEDICATIE

Belangrijk bij een acute aanval:

- antihistaminica inj. i.v.
- adrenaline inj. 0,5 mg s.c./i.m.
- corticosteroiden i.v.
- tranexaminezuur 1000 mg p.o./i.v.
- C1-esteraseremmer 1000 E i.v.
- icatibant inj. 30 mg s.c.

### BEHANDELEND ARTS

Naam: \_\_\_\_\_

Telefoon: 0031 \_\_\_\_\_

Bellen bij nood: 0031 \_\_\_\_\_

01/2011

### MEDICATION

Important in case of emergency:

- antihistaminics i.v.
- epinefrine inj. 0,5 mgr s.c./i.m.
- corticosteroids i.v.
- tranexamic acid 1.000 mgr po/iv
- C1-esterase inhibitor 1.000 E i.v.
- icatibant inj. 30 mgr s.c.

### CONSULTING PHYSICIAN

Name: \_\_\_\_\_

Phone: 0031 \_\_\_\_\_

In case of emergency phone: 0031 \_\_\_\_\_

# ATTENTION: medical information!



[www.hae-qe.nl/sos](http://www.hae-qe.nl/sos)

## DHR/MEVR

lijdt aan niet-hereditair **idiopatisch angio-oedeem (AE)**

**DIT KAN FATAAL ZIJN!**

De oorzaak van idiopatisch AE is onbekend. Ongeremde activering van het complement systeem en het plasmine-kinine systeem treden op. Histamine vrijzetting heeft slechts een beperkte betekenis. Attentie is geboden bij ongevallen, chirurgische ingrepen, bij- en wespsteken, het instellen van behandeling met antihypertensiva.

## SYMPTOMEN

AE wordt gekenmerkt door het spontaan per acuut optreden van zwellingen in het onderhuidse bindweefsel. Vooral ter plaatse van:

- tong en/of keel
- gelaat (oogleden, wang en lippen)
- uitwendige geslachtsdelen
- handen en voeten

Ook bij manipulatie in de mond (tandarts) kan zwelling ontstaan.

Zwelling in de keel kan potentieel gevaar opleveren door afsluiting van de luchtweg.

## MR/MS/MRS

suffers from non-hereditary **idiopatic angio-edema (AE)**

**THIS IS POTENTIALLY FATAL!**

The etiology of idiopatic AE is unknown. Both the complement and bradykinin systems are excessively activated. Release of histamine is of minor importance.

Special attention is needed in case of trauma, surgical procedures, insect stings and on initiating hypertension treatment.

## SYMPTOMS

AE is characterized by bouts of peracute diffuse swellings in the subcutaneous tissue, in particular localized at:

- tongue and/or throat
- face (eyelids/cheeks/lips)
- external genitals
- distal extremities

Manipulation in the oral cavity (dentist) may accidentally cause oedema.

Laryngeal oedema is potentially life-threatening due to airway blockage.